

واحد آموزش و پیگیری بیمار

آمپوتاسیون



- شما مددجوی عزیز که دچار قطع عضو شده‌اید بدانید که مراقبت اصولی و صحیح از زخم بسیار با اهمیت می‌باشد.
- طبق دستور جراح فقط پانسمان را تعویض کرده و هرگز زخم را دستکاری نکنید
- آنتی بیوتیک‌ها و داروهای ضد انعقاد را خودسرانه قطع نکنید و منظم و دقیق مصرف کنید
- برای ترمیم بهتر زخم علاوه بر پانسمان و مصرف دارو، تغذیه و حرکت هم مهم می‌باشد. برای ترمیم بهتر زخم پروتئین کافی مصرف کرده و در صورت توصیه پزشک تمرینات ایمن و فیزیوتراپی انجام دهید



وضعیت سبز، پایدار و ایمن

در این مرحله زخم در حال بهبود است

شما دوست عزیز علائم حیاتی پایدار دارید

علامت عفونت در محل آمپوتاسیون مانند قرمزی، تورم، درد، ترشحات چرکی، استشمام بوی بد ندارید

در این مرحله شما دوست عزیز با ادامه داروها و تعویض پانسمان به ادامه درمان پردازید

دارو پانسمان



وضعیت زرد-هشدار

وجود یک یا دو مورد از علائم زیر

شروع تب تا ۳۸ درجه

قرمزی با ترشح غیر طبیعی

خونریزی بیش از حد از محل آمپوتاسیون

عدم تحمل درد در ناحیه آمپوتاسیون



ناحیه قرمز (اورژانس)

تب بالا، افت فشار خون، تاکی کاردی

تنگی نفس

خونریزی غیر قابل کنترل

بدحالی شدید در این مرحله سریعاً به اورژانس مراجعه کنید

